



Esquema Nacional de Vacunación El Salvador 2012



RECIÉN NACIDO



BCG
Previene formas invasoras de tuberculosis

2 MESES 4 MESES 6 MESES



3 Dosis (2,4 y 6 meses)

PENTAVALENTE
Incluye:
Difteria, Tosferina y Tétanos
Hepatitis B
Haemophilus influenza tipo B

Polio oral
Poliomielitis

2 Dosis (2 y 4 meses)

ROTAVIRUS

Neumococo Infantil 13 Valente
Meningitis, Neumonía, Otitis Media

12 MESES



1° Dosis de:

Triple Viral SPR
Sarampión, Paperas y Rubeola

1° Refuerzo de:

Neumococo Infantil 13 Valente
Meningitis, Neumonía, Otitis Media

15 A 18 MESES



1° Refuerzo de:

PENTAVALENTE
Incluye:
Difteria, Tosferina y Tétanos
Hepatitis B
Haemophilus influenza tipo B

Polio oral
Poliomielitis

4 AÑOS



2° Refuerzo de:

DPT
Difteria, Tosferina y Tétanos
Polio oral
Poliomielitis

2° Dosis de:

Triple Viral SPR
Sarampión, Paperas y Rubeola

ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES



Td
Tétanos y Difteria
Toda persona debe recibir 1 dosis cada 10 años a partir de los 10 años de edad

MUJERES EMBARAZADAS



Td
Tétanos y Difteria
Toda mujer embarazada con esquema completo de vacunación hasta los 4 años de edad, aplicar 1 dosis de Td a partir de la 16ª semana de gestación.

Toda mujer embarazada con esquema incompleto de vacunación, se aplicarán dos dosis de Td 1ª dosis a partir de la 16ª semana de gestación 2ª dosis con un intervalo mínimo de 4 semanas de la 1ª dosis

Influenza
A partir de la 12ª semana de gestación

GRUPOS EN RIESGO Y PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS



Td
Tétanos y Difteria
HB
Hepatitis B

SR
Sarampión y Rubéola

Influenza
Niños de 6 meses a 4 años de edad, adultos mayores de 60 años y personal de salud

Neumococo 23 Valente
En niños mayores de 2 años que presentan factores de riesgo, adultos mayores de 60 años y personal de Salud.