










ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACIÓN, EL SALVADOR 2021



MINISTERIO DE SALUD

RECIÉN NACIDO	2,4 Y 6 MESES	12 MESES	15 A 18 MESES	4 AÑOS	9 AÑOS	ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES	MUJERES EMBARAZADAS	GRUPOS EN RIESGO Y PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS
								
<p>BCG</p> <p>Previene formas graves de tuberculosis.</p> <hr/> <p>HB</p> <p>Hepatitis B, en las primeras 12 horas de vida.</p>	<p>3 DOSIS (2, 4 Y 6 MESES)</p> <p>PENTAVALENTE Incluye: Difteria, Tosferina, Tetanos y Haemophilus Influenza tipo B Hepatitis B.</p> <hr/> <p>POLIOMIELITIS 2, 4 y 6 meses : IPV</p> <p>2 DOSIS (2 Y 4 MESES)</p> <p>ROTAVIRUS 2 DOSIS (2 Y 4 MESES)</p> <p>NEUMOCOCO CONJUGADO Meningitis, Neumonía y Otitis media.</p>	<p>1º DOSIS DE:</p> <p>TRIPLE VIRAL TIPO SPR Sarampión Paperas Rubéola.</p> <hr/> <p>1º REFUERZO DE:</p> <p>NEUMOCOCO CONJUGADO Meningitis, Neumonía y Otitis media.</p>	<p>1º REFUERZO DE:</p> <p>PENTAVALENTE Incluye: Difteria, Tosferina, Tetanos y Haemophilus Influenza tipo B Hepatitis B.</p> <hr/> <p>POLIO ORAL Poliomielitis.</p> <p>2º DOSIS DE:</p> <p>TRIPLE VIRAL TIPO SPR Sarampión Paperas Rubéola.</p>	<p>2º REFUERZO DE:</p> <p>DPT Difteria Tosferina Tétanos.</p> <hr/> <p>POLIO ORAL Poliomielitis.</p>	<p>VPH</p> <p>Previene el Cáncer de Cérvix o cuello de matriz, causado por el Virus del Papiloma Humano.</p> <hr/> <p>1º DOSIS: Niñas de 9 años.</p> <p>2º DOSIS: 6 meses después de aplicada la primera.</p>	<p>Td</p> <p>Tétanos y Difteria. Toda persona debe recibir 1 dosis cada 10 años a partir de los 10 años de edad.</p> <hr/> <p>NEUMOCOCO Todo persona adulta mayor de 60 años con factores de riesgo debe recibir una dosis de neumococo.</p>	<p>Td</p> <p>Tétanos y Difteria. Toda mujer embarazada con esquema completo de vacunación, aplicar 1 dosis de Td a partir de la 16º semana de gestación.</p> <hr/> <p>Tdpa Tétanos, Difteria, Tosferina acelular. Aplicar 1 dosis en cada embarazo, a partir de las 20 semanas de gestación.</p> <hr/> <p>INFLUENZA HEMISFERIO SUR En su primer control del embarazo no importando la edad gestacional.</p>	<p>Td</p> <p>Tétanos y Difteria.</p> <hr/> <p>HB Hepatitis B.</p> <hr/> <p>SR Sarampión y Rubéola.</p> <hr/> <p>INFLUENZA HEMISFERIO SUR Niños de 6 meses a 59 meses, personas adultas mayores de 60 años y personal de salud.</p> <hr/> <p>NEUMOCOCO CONJUGADO A personas mayores de 2 años con factores de riesgo.</p>