



MINISTERIO
DE SALUD

LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACION DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) CON ENFOQUE EN INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACION DE LA SALUD

NOVIEMBRE, 2021

GENERALIDADES DE LA VACUNACION

OBJETIVO DE LA VACUNACIÓN

- Vacunar a las niñas contra el Virus del Papiloma Humano para la prevención del cáncer cérvico uterino.

Población blanco y Número de dosis

- Niñas desde los 9 años hasta un día antes de cumplir los 10 años: son dosis con un intervalo mínimo de 6 meses entre las dosis.
- Niños y niñas que estén inmunocomprometidos o infectados con VIH, deben recibir tres dosis: Primera dosis: 1 contacto, 2ª dosis: 1 mes después de la primera, 3ª dosis: 6 meses después de la primer dosis.
- Toda niña a partir de los 10 años hasta los 14 años que sufra abuso sexual y consulta en las primeras 24 horas se le aplicara vacuna contra el VPH: 2 dosis

META

- Vacunar por lo menos al 90 % de la población objetivo.

ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN A UTILIZAR

Vacunación de Poblaciones Cautivas

Se vacunará a la población cautiva en las instituciones educativas tanto públicas como privadas así del área urbana y rural.

Vacunación Intramural

Se debe realizar vacunación en el cien por ciento de establecimientos de salud del MINSAL y del ISSS

Vacunación casa a casa

Se deben conformar equipos de vacunación que previa programación realizarán visitas Casa a Casa,

Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano



Vía de Administración: Intramuscular en el deltoides del brazo izquierdo



Forma Farmacéutica: Suspensión Inyectable por vía Intramuscular



Presentación: Vial monodosis de 0.5 ml

PROCESO PARA REALIZAR EL ACTO VACUNAL (1)

Previo a la vacunación, deben tomarse en cuenta las siguientes condiciones:

- Debe informar a la niña sobre la vacuna que se le va a aplicar (sin alarmar a la persona).
- Debe investigar los siguientes factores desencadenantes, que puedan ocasionar efectos adversos no relacionados con la aplicación de la vacuna:
 - ayuno,
 - baja ingesta de líquidos,
 - ambientes calurosos,
 - Estar de pie prolongadamente.

PROCESO PARA REALIZAR EL ACTO VACUNAL (2)

- Siempre que se pueda la vacuna se debe aplicar en lugar privado, bien ventilado y la persona debe estar sentada.
- De preferencia estar acompañado por alguien de confianza: maestro, coordinador, entre otros.
- Investigar de manera ágil y rápida a cada una de las niñas previo a su vacunación, investigando embarazo
- Se les debe explicar sobre la finalidad de la vacunación
- Se les debe Orientar sobre los cuidados inmediatos a la vacunación.

¿QUÉ ES IEC?



OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE IEC



Contribuir a la prevención del cáncer cérvico uterino, a través de la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) para niñas de 9 años hasta un día antes de cumplir los 10 años de edad, completando segunda dosis 6 meses después de la primera, según el esquema nacional de vacunación.

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA ESTRATEGIA.

- Informar a la población en general, personal de salud, actores claves de gobierno, sociedad civil, Instituciones formadoras y religiosas sobre la existencia, beneficios de la vacuna contra en VPH, además de su gratuidad y eficacia como una forma de prevenir el cáncer de cuello de matriz.
- Motivar a padres, madres y responsables de niñas de 9 años hasta un día antes de cumplir los 10 años de edad, para que lleven y/o autoricen la vacunación contra el VPH, como una forma de prevenir el cáncer cérvico uterino.



ES UN CONJUNTO DE INTERVENCIONES PLANIFICADAS QUE COMBINAN PROCESOS DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN CUYO OBJETIVO ES LOGRAR CAMBIOS MEDIBLES DE COMPORTAMIENTO Y ACTITUD EN LAS POBLACIONES META, BASADO EN EL ESTUDIO DE SUS NECESIDADES Y PERCEPCIONES.



LA EDUCACIÓN:

SE REFIERE AL PROCESO DE FACILITAR EL APRENDIZAJE, PARA PERMITIR A LOS PÚBLICOS OBJETIVOS TOMAR DECISIONES RACIONALES E INFORMADAS, E INFLUIR SOBRE SU COMPORTAMIENTO A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO.





MINISTERIO
DE SALUD

PLAN DE INFORMACION, EDUCACION Y
COMUNICACION (IEC).

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA VACUNA QUE
PREVIENE EL CANCER CERVICO UTERINO CAUSADO
POR EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO-(VPH).

INCLUYENDO LA COMUNICACIÓN EN CRISIS.

El Salvador, enero de 2020.



ESTRATEGIAS A UTILIZAR PARA PREVENIR EL VPH



- Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en redes sociales.
- Coordinación con actores sociales claves y medios de comunicación para lograr un mayor impacto en la población .
- Lograr el cambio de conducta en la población en general sobre la vacuna del papiloma humano (VPH).

POBLACIONES METAS A INTERVENIR

PRIMARIA:

- Madres, padres o responsables permitan la vacunación contra el VPH a las niñas de 9 años hasta un día antes de cumplir los 10 años de edad de forma conciente e informada

POBLACIONES META

SECUNDARIA:

- Directores/as, maestros y maestras de Centros educativos de educación primaria para que se apropien de la tematica de la vacunacion de VPH para prevenir el cancer de cervico uterino y promuevan los espacios con la comunidad eductiva.

POBLACIONES META

TERCIARIA

Que el personal de salud oriente, informe y eduque de forma efectiva a la población acerca de la vacuna del Papiloma Humano (VPH)

ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACIÓN, EL SALVADOR 2021



MINISTERIO
DE SALUD

RECÉN NACIDO	2, 4 Y 6 MESES	12 MESES	15 A 18 MESES	4 AÑOS	9 AÑOS	ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES	MUJERES EMBARAZADAS	GRUPOS EN RIESGO Y PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS
								
BCG Previene formas graves de tuberculosis.	3 DOSIS (2, 4 Y 6 MESES) PENTAVALENTE Incluye: Difteria, Tosferina, Tétanos y Haemophilus Influenza tipo B Hepatitis B.	1ª DOSIS DE: TRIPLE VIRAL TIPO SPR Sarampión Paperas Rubéola.	1º REFUERZO DE: PENTAVALENTE Incluye: Difteria, Tosferina, Tétanos y Haemophilus Influenza tipo B Hepatitis B.	2º REFUERZO DE: DPT Difteria Tosferina Tétanos.	VPH Previene el Cáncer de Cérvix o cuello de matriz, causado por el Virus del Papiloma Humano.	Td Tétanos y Difteria. Toda persona debe recibir 1 dosis cada 10 años a partir de los 10 años de edad.	Td Tétanos y Difteria. Toda mujer embarazada con esquema completo de vacunación, aplicar 1 dosis de Td a partir de la 16ª semana de gestación.	Td Tétanos y Difteria.
HB Hepatitis B, en las primeras 12 horas de vida.	POLIOMIELITIS 2, 4 y 6 meses: IPV 2 DOSIS (2 Y 4 MESES) ROTAVIRUS 2 DOSIS (2 Y 4 MESES) NEUMOCOCO CONJUGADO Meningitis, Neumonía y Otitis media.	1º REFUERZO DE: NEUMOCOCO CONJUGADO Meningitis, Neumonía y Otitis media.	POLIO ORAL Poliomielitis. 2º DOSIS DE: TRIPLE VIRAL TIPO SPR Sarampión Paperas Rubéola.	POLIO ORAL Poliomielitis.	1ª DOSIS: Niños de 9 años. 2ª DOSIS: 6 meses después de aplicada la primera.	NEUMOCOCO Toda persona adulta mayor de 60 años con factores de riesgo debe recibir una dosis de neumococo.	Tdap Tétanos, Difteria, Tosferina acelular. Aplicar 1 dosis en cada embarazo, a partir de las 20 semanas de gestación.	HB Hepatitis B.
							INFLUENZA HEMISFERIO SUR En su primer control del embarazo no importando la edad gestacional.	SR Sarampión y Rubéola.
							INFLUENZA HEMISFERIO SUR Niños de 6 meses a 59 meses, personas adultas mayores de 60 años y personal de salud.	NEUMOCOCO CONJUGADO A personas mayores de 2 años con factores de riesgo.

SOPA DE LETRAS

Encuentra las palabras claves relacionadas a la vacuna del Virus del Papiloma Humano (VPH) que previene el cáncer de cérvix.

S	C	V	D	A	X	Z	P	R
A	A	P	A	H	C	E	H	W
L	N	H	M	C	L	Ñ	L	Q
U	C	A	R	E	U	I	C	T
D	E	S	T	R	Z	N	T	F
O	R	K	I	V	I	D	O	E
P	R	E	V	E	N	I	R	O
C	E	R	V	I	X	D	O	C

Completa la frase:

Yo me _____ contra el _____
para _____ el _____ de _____.

#LasVacunasSalvanVida
#EsTuDerecho
#PorqueMeQuieroMeVacuno

¿PREGUNTAS?



¡Gracias!