CUIDADOS PALIATIVOS COVID-19 H.N. ES

DR. CARLOS A. REYES SILVA

Jefe Unidad de Dolor y Cuidados Paliativos

Sumario

- Definiciones en Cuidados Paliativos.
- Ordenamiento Jurídico.
- Principales principios de Bioética
- Cuales deberían ser los criterios de ingreso SARS COV-2.
- Plan de acción.
- Control de síntomas.
- Acompañamiento familiar.
- Duelo.
- Conclusiones
- Preguntas y respuestas.

SITUACIÓN NACIONAL COVID-19

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 5 DE SEPTIEMBRE 2021 15:01 p.m.

Mapa de Riesgo

- Niveles de Riesgo**
- MUY BAJO
 - BAJO
 - MEDIO
 - ALTO
 - MUY ALTO

A Flourish map

Nueva definición de consenso de CUIDADOS PALIATIVOS por la IAHPC En COVID 19

“Los Cuidados Paliativos son la asistencia activa, holística, de personas de todas las edades con sufrimiento severo relacionado con la salud debido a una enfermedad grave, y especialmente de aquellos que están cerca del final de la vida. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus familias y sus cuidadores.”

«Lo peor para una persona no es constatar que ha vivido y ahora debe morir, Lo peor es comprender que no ha vivido y ahora tienen que morir.»

Dame Cicely Saunders

Herramientas para brindar atención y apoyo a los pacientes , familiares y equipo asistencial.

Control de síntomas para confortabilidad.

Objetivo principal: **Calidad de Vida**

Brindar **atención integral de la salud:** física, psicológica y espiritual.

Apoyar en la toma de **decisiones difíciles.**

Contexto Clínico SARS CoV -2

Eq. Multidisciplinario

Marco Legal

MINISTERIO
DE SALUD

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

ASAMBLEA LEGISLATIVA
REPUBLICA DE EL SALVADOR

LEY DE DEBERES Y DERECHOS
de los pacientes y
prestadores de servicio de salud

Lineamientos técnicos para el manejo de cuidados paliativos
ante la pandemia por COVID-19

Publicaciones de la Asamblea Legislativa
www.asamblea.gub.ec

Este documento ha sido elaborado por profesionales de las siguientes instituciones:

Hospital Divina Providencia

Avaluado por:

EQUIPO TÉCNICO QUE ELABORÓ LA GUÍA:

1. Dr. Rolando Lario Lora
2. Hermana María Julia García Yáquez CMST
3. Dr. Carlos Alfonso Reyes Silva
4. Dr. Mario Colocado Castellanos
5. Dr. José María López Sara
6. Dra. Ana Tatiana Fong Escobar
7. Lic. Marco Rodríguez Paz

San Salvador, 27 de abril de 2020

PROYECTO

UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS PARA PACIENTES COVID-19 EN
HOSPITAL NACIONAL EL SALVADOR

15 MARZO 2021

Criterios de la atención Paliativa pacientes COVID-19

Estrategias de Plan de acción Paliativo , ante la Situación Clínica de pacientes COVID-19

- Valorar realizar triage desde su ingreso y definir cuales deberían ser los criterios de ingreso SARS COV-2.
- Traslado a un área de menor complejidad, a los pacientes que por una condición u otra no se benefician de VMI garantizando la atención paliativa.
- Toma de decisiones en conjunto: EID, medico Intensivista, paciente y familia
- Control de síntomas Disconfortantes.
- Control de síntomas refractarios (sedación paliativa).
- Acompañamiento familiar: emocional y psicológico.
- Trabajo de Duelo anticipado.

EUROPEAN RESPIRATORY *journal*
FLAGSHIP SCIENTIFIC JOURNAL OF ERS

Early View

Task force report

COVID-19: Guidance on Palliative care from a European Respiratory Society International Task Force

Definición de LAS VOLUNTADES ANTICIPADAS por la IAHPC en COVID 19

“Son las disposiciones que una persona **decide** estando en **buenas condiciones de salud mental**, sobre que medidas y **cuidados médicos quiere o no recibir** en presencia e una enfermedad grave.”

INSTRUMENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE ENFERMEDAD CRÓNICA AVANZADA Y DETECCIÓN DE ATENCIÓN PALIATIVA EN SERVICIOS DE SALUD Y SOCIALES.

Instrumento NECPAL-CCOMS

Gómez-Batiste X et al. Identificación de personas con enfermedades crónicas avanzadas y necesidades de atención paliativa en servicios sanitarios y sociales: elaboración del instrumento NECPAL CCOMS-ICO. *Med Clin (Bar)* 2013;140(6):241-245.

INSTRUMENTO NECPAL CCOMS-ICO[®]

(Necesidades Paliativas)

INSTRUMENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE ENFERMEDAD AVANZADA – TERMINAL Y NECESIDAD DE ATENCIÓN PALIATIVA EN SERVICIOS DE SALUD Y SOCIALES

1. LA PREGUNTA SORPRESA – una pregunta intuitiva que integra comorbilidad, aspectos sociales y otros factores	
¿Le sorprendería que este paciente muriese en los próximos 12 meses?	☐ No ☐ Sí

2. ELECCIÓN / DEMANDA O NECESIDAD¹ – explore si alguna de las siguientes dos preguntas es afirmativa	
Elección / demanda: ¿el paciente con enfermedad avanzada o su cuidador principal han solicitado , explícita o implícitamente, la realización de tratamientos paliativos / de confort de forma exclusiva, proponen limitación del esfuerzo terapéutico o rechazan tratamientos específicos o con finalidad curativa?	☐ Sí ☐ No
Necesidad: ¿considera que este paciente requiere actualmente medidas paliativas o tratamientos paliativos?	☐ Sí ☐ No
3. INDICADORES CLÍNICOS GENERALES DE SEVERIDAD Y PROGRESIÓN – explore la presencia de cualquier de los siguientes criterios de severidad y fragilidad extrema	
Marcadores nutricionales , cualquiera de los siguientes, en los últimos 6 meses : ☐ Severidad: albúmina sérica < 2.5 g/dl, no relacionada con descompensación aguda ☐ Progresión: pérdida de peso > 10% ☐ Impresión clínica de deterioro nutricional o ponderal sostenido, intenso / severo, progresivo, irreversible y no relacionado con proceso intercurrente	☐ Sí ☐ No
Marcadores funcionales , cualquiera de los siguientes, en los últimos 6 meses : ☐ Severidad: dependencia funcional grave establecida (Barthel < 25, ECOG > 2 ó Karnofsky < 50%) ☐ Progresión: pérdida de 2 o más ABVD (actividades básicas de la vida diaria) a pesar de intervención terapéutica adecuada ☐ Impresión clínica de deterioro funcional sostenido, intenso / severo, progresivo, irreversible y no relacionado con proceso intercurrente	☐ Sí ☐ No
Otros marcadores de severidad y fragilidad extrema , al menos 2 de los siguientes, en los últimos 6 meses : ☐ Úlceras por decúbito persistentes (estadio III – IV) ☐ Infecciones con repercusión sistémica de repetición (> 1) ☐ Síndrome confusional agudo ☐ Disfagia persistente ☐ Caídas (> 2)	☐ Sí ☐ No
Presencia de distress emocional con síntomas psicológicos sostenidos, intensos/severos, progresivos y no relacionados con proceso intercurrente agudo	☐ Sí ☐ No
Factores adicionales de uso de recursos , cualquiera de los siguientes: ☐ 2 ó más ingresos urgentes (no programados) en centros hospitalarios o sociosanitarios por enfermedad crónica en el último año ☐ Necesidad de cuidados complejos / intensos continuados, bien sea en una institución o en domicilio	☐ Sí ☐ No
Comorbilidad: ≥ 2 patologías concomitantes	☐ Sí ☐ No

ECOG		KARNOFSKY	
Actividad completa, puede cumplir tareas como antes enfermedad	0	100 Normal, sin signos enfermedad	
Sólo actividades que no requieren esfuerzos, sigue siendo ambulatorio y haciendo trabajos ligeros	1	90 Capaz de actividades normales pero con síntomas leves	
Ambulatorio y capaz de cuidarse pero no de realizar cualquier trabajo. Encamado menos del 50 % del día	2	80 Actividad normal con esfuerzo, algunos síntomas mórbidos	
Sólo puede cuidarse en parte, encamado durante más del 50 % del día	3	70 Capaz de cuidarse pero no de realizar actividad normal o trabajo	
Totalmente inválido e incapaz de cuidarse, encamado por completo	4	60 Requiere atención ocasional, pero puede cuidar de sí mismo	
Muerto	5	50 Requiere gran atención, incluso médica	
		40 Inválido, necesita cuidados y atenciones especiales.	
		30 Inválido grave, hospitalización y tratamiento de soporte activo	
		20 Muy enfermo, necesita hospitalización y tratamiento activo	
		10 Moribundo	
		0 Muerto	

Predicción del riesgo de progresión en pacientes con neumonía por COVID-19: Score CALL

	Puntos
Comorbilidad	
Sin	1
Con	4
Edad (años)	
≤60	1
>60	3
Linfocitos mil/mm³	
>1.0	1
≤1.0	3
LDH (U/L)	
≤250	1
250-500	2
>500	3

Se clasificaron en 3 niveles de riesgo de acuerdo con las probabilidades de progresión:

- Clase A** aquellos con 4-6 puntos tuvieron menos del 10% de probabilidades de progresión y fueron considerados de bajo riesgo.
- Clase B** aquellos con 7-9 puntos tuvieron 10%-40% de probabilidades de progresión y fueron considerados de riesgo intermedio
- Clase C** aquellos con 10-13 puntos tuvieron 50% de probabilidades de progresión y fueron considerados de alto riesgo.

Ji D et al. Clin Infect Dis. 2020 Apr 9. pii: ciaa414. doi: 10.1093/cid/ciaa414.

www.infectologia.edu.sv

ADECUACIÓN DEL ESFUERZO TERAPÉUTICO

- **Uso de vía subcutánea**
- **Uso de anticolinérgicos para disminuir secreciones pulmonares.**
- **Mover al paciente de UCI a intermedios / Hospitalización.**

Respeten mis principios
éticos: no-maleficencia,
autonomía y justicia,
beneficencia.

SINTOMAS MAS FRECUENTES

**DESASOSIEGO
DELIRIO**

**TOS Y
DISNEA**

FIEBRE

DOLOR

**LEVE A
MODERADO**

**SUFRIMIENTO DE
LA FAMILIA**

SINTOMAS FRECUENTES

**DESASOSIEGO
DELIRIO**

**TOS Y
DISNEA**

FIEBRE

DOLOR

**DE MODERADO A
MUY SEVERO**

**SUFRIMIENTO DE
LA FAMILIA**

SÍNTOMAS PACIENTE (COVID)

SINTOMAS UCI / UCIN:	FRECUENCIA:
DISNEA (falta de aire)	100 %
DOLOR (dolor muscular)	60 %
DESASOSIEGO O AGITACION	70%
DELIRIO	80 %
DIATESIS HEMORRAGICA / ISQUEMICA	15-20 %
SEPSIS	80 %
FALLA CARDIACA	60%
FALLA RENAL	80%

Nuestra Experiencia

EL SUFRIMIENTO DEL
PACIENTE AUN CONCIENTE Y
MAS O MENOS ESTABLE, AL
VER DIFERENTES ESCENAS DE
OTROS ENFERMOS.

Tratamiento

PASO 1

POSICION PRONO
EXPLICAR LA CONDICION Y TRATAMIENTO COVID

PASO 2

DIFERENTES SISTEMAS DE SOPORTE VENTILATORIO

PASO 3

USO DE OPIOIDES PARA MENEJO DE DISNEA Y DISMINUIR LA FATIGA MUSCULAR RESPIT.

PASO 4

USO DE BENZODIAZEPINA ACCION RAPIDA PARA RETRASAR O EVITAR LA VMI. SEDACION PALIATIVA

Tratamiento Sintomático: Disnea – Dolor - Angustia

SINTOMA:	MEDICAMENTO	DOSIS:	EFECTO SECUNDARIO:
DISNEA / DOLOR	MORFINA	<ul style="list-style-type: none"> - Dosis inicial: 2.5mg Via SC cada 4h o cada 6 hrs. (modificado en horario) - En disnea refractaria: Infusión 15-30 mg/24h (a completar 100 ml con suero fisiológico). - Pautar “rescates” el 10 % de la dosis en 24 hrs y ajustar dosis según respuesta. 	Vigilar: neurotoxicidad: alucinaciones, mioclonías, confusión.
	DEXAMETASONA	Mantener 8 mg /día.	
ANGUSTIA ANSIEDAD	MIDAZOLAM	<ul style="list-style-type: none"> - Son muy efectivas usar a bajas de tipo intermitente a dosis de 2.5 - 5 mg. Via SC cada 4 hrs. - En perfusión intravenosa a dosis de 30 a 45 mg (MAX. 160 – 200 mg / 24 horas). <p>“El objetivo será aliviar y evitar la sedación paliativa por síntoma refractario o llegar a VMI”.</p>	No descritos
BRONCORREA / ESTERTORES	BUTILHIOSHINA	<ul style="list-style-type: none"> - Dosis de 20 mg a 40 mg cada 8 horas (IV o SC) <p>Su uso esta sugerido para disminuir la secreciones.</p>

Tratamiento Sintomatico: Delirio

Medicación:	Dosis 24 hrs.	Presentación:	Ampolla:	Volumen:
CLORPROMAZINA	600 – 1200 mg/día	Amp. 100mg/2ml.	6 - 12	6-12 ml.
HALOPERIDOL	5 mg cada 6 hr. (20-40 mg en 24 hrs.)	Amp. 5 mg / 1ml.	4 - 6	4 – 6 ml.

Cuidados sintomáticos

A photograph of a medical workstation. In the background, there is a box of Cruzadas (Cruzadas) and a box of Z-calcium. In the foreground, there are several small vials, a syringe, and a clear plastic container. The text is overlaid on the image.

CUIDADOS EN RELACIÓN A:

- Dolor
- Disnea
- Delirium y agitación
- Estertores
- Ansiedad y/o depresión

• FÁRMACOS MÁS UTILIZADOS

- Morfina
- Haloperidol
- Metoclopramida
- Hioscina
- Midazolam

La sedación paliativa será la maniobra terapéutica que se utilizará en pacientes no recuperables y que no son candidatos a cuidados intensivos por COVID-19, y que evolucionan desfavorablemente con mal pronóstico a corto plazo.

Como medir nivel de conciencia en Sedación

TABLA 1. Valoración de la sedoanalgesia (escala de Ramsay modificada)

- I. Despierto, alerta y orientado. Rechazo del PI con movimientos o llanto vigoroso
- II. Letárgico. Despierto y orientado cuando se le habla. Rechazo del PI con movimientos o llanto débiles
- III. Letárgico. Sólo despierta con la estimulación física. Desorientado. No rechazo del PI. Movimientos o llanto muy leves
- IV. Ausencia de respuesta a estímulos físicos. No movimientos ni llanto durante el PI

Adaptada de: Ramsay M et al¹ y Hansen J, et al².
PI: procedimiento invasivo.

Intervenciones Paliativas en H. N. ES

INTERCONSULTAS FORMALES

Intervenciones
Multidisciplinarias en
UCI / UCINT.

937

INTERVENCIONES A FAMILIARES

Realizadas a grupo
familiar para apoyo en
la toma de decisiones.

650

INTERVENCIONES EN CRISIS

En familias que su
familiar, con estado
cognitivo estable, ha
denegado VMI.

750

SEGUIMIENTO A NIÑOS

Detectar sufrimiento
total por afección de
COVID a sus papas, en
apoyo CON HNBB y T.S.
H.N ES.

2

PRESENCIA Y APOYO EN COMUNICACION

Por medio de
videollamadas, cartas,
mensajes de vos, audios,
fotografías, artículos
religiosos.

875

INTERVENCION DIRECTA AL PACIENTE EN CRISIS

Manejo de Estrés, de
Disnea, Dolor, ansiedad,
acoplamiento de CPAP

785

EDUCACION MEDICO CONTINUA

Educación Médica local.
Programa De Geriatria.
Capacitación intermedia
en CP.. MINSAL – HDP.

3

RECONOCIMIENTO AL EQ. UDCP H.N.ES

Entrega de Diplomas.
Capacitaciones.
Agradecimiento de
Familiares y pacientes.

ALTO

APOYO EN EL SUFRIMIENTO, MEJORANDO LA COMUNICACION

A PESAR DE LO COMPLICADO
DEL CASO Y DE LA
DESESPERANZA..... NUNCA
DEBEMOS QUITARLE LA FE
AL PACIENTE Y SU FAMILIA.

NUESTRA HISTORIA

EVITANDO EL BORNAUT

LLEVANDO ALEGRIA Y
UNA LUZ A NUESTROS
PACIENTES.

Autocuidado

- Los profesionales afrontan situaciones de alta carga emocional.
- Somos testigos de importantes sufrimientos.
- Es desafiante y gratificante a la vez
- Se tomaran decisiones que afectaran directamente al paciente
- Profesionales alejados de la familia.
- El deber de cuidarnos (autoprotección, temor a contagiarnos)

Conclusiones

- Las intervenciones paliativas deben integrarse con el tratamiento curativo.
- Todos los médicos, enfermeras, trabajadores sociales, terapeutas respiratorios, psicólogos y otras personas que atiendan a pacientes con COVID 19, deben brindar cuidados paliativos básicos a través de educación continua, sensibilización y humanización.

SECPAL 2020

Conclusiones

Una secuencia breve centrada en cuidados paliativos y principios éticos fundamentales, puede disminuir el riesgo de realizar **acciones no éticas** como: la eutanasia, la obstinación terapéutica o un abandono terapéutico del paciente y su familia.

Muy seguramente los pacientes con COVID-19 muy severo, junto a su familiar, quizá no puedan a veces tomar decisiones sobre dónde y cómo quiere morir.

LO IDEAL PARA TRABAJAR EN EQUIPO:

Velar por la calidad de vida del paciente y su familia y del Eq. de trabajo

Permitir tomar decisiones

01

02

facilitar intervención en crisis, durante visita medica.

Facilitar recursos:

Psicólogo

fisioterapeuta o función de t. respiratoria

03

Finalidad de la predicción de sobrevida en cuidados paliativos

- **Equilibrar la información realista sin aumentar la ansiedad ni reducir la confianza.**
- **Permitir la esperanza y el optimismo sin crear expectativas poco realistas.**

EQUIPO DE CUIDADOS PALIATIVOS DEL H. N. ES.

**“En la lucha contra
el COVID-19 Nadie
lucha solo, porque
nosotros le
acompañamos”**

Muchas Gracias