



# Dacriocistitis

Dra. Laura Mirela Moreno Reyes  
Centro Oftalmológico Zacamil, HNZ.

# Anatomía





# Epidemiología

---

## Distribución bimodal

---

Justo después del nacimiento en casos congénitos

---

Adultos mayores de 40 años.

---

La dacriocistitis congénita ocurre en aproximadamente 1 de cada 3884 nacidos vivos.

---

En los adultos, los blancos tienden a verse más afectados.

---

Las mujeres representan casi el 75% de todos los casos.

---

Morbilidad y Motilidad.

# Origen Etimológico

Raíces griegas

dakryon  
(lágrima)

kystis (bolsa  
que lleva  
líquidos)

Más el sufijo -  
itis  
(inflamación).



# Clasificación

- Congénita
- Aguda
- Crónica

# Patología

Obstrucción  
en el sistema  
nasolagrimal

Propagación  
de M.O. y se  
forman  
desechos  
proteicos.

Localizada en  
la porción  
inferomedial  
de la órbita.

Estancamiento  
de las  
lágrimas.

Inflamación de  
Saco Lagrimal



# Dacriocistitis Aguda

Dolor subagudo en área del canto interno + epifora

Tumefacción enrojecimiento, tenso y muy doloroso a palpación en canto interno

Absceso

Celulitis Preseptal

# Agentes Etiologicos

Staphylococcus  
aureus

Streptococcus  
beta-hemolítico.

*Haemophilus influenza* y *Pseudomonas aeruginosa*.

# Dacriocistitis Crónica

Epifora crónica +  
conjuntivitis crónica  
unilateral o  
recidivante

Mucocele en forma  
de tumoración  
indolora en canto  
interno.

No abultamiento  
evidente

Reflujo canalicular  
mucopurulento



# Tratamiento

## Agudo

- Compresas tibias/calientes
- ATB oral
- Sajar el absceso o drenarlo si hay fluctuación de pus




## Crónico

- Dacriocistorritomía (DCR) = formar una fístula permanente entre el saco lagrimal y la fosa nasal.



# Masaje de Crigler



# Diagnostico Diferencial

- Celulitis preseptal / periorbitaria
- Celulitis orbitaria
- Quiste sebáceo
- Sinusitis frontal, etmoidal o maxilar
- Neoplasma
- Ectropión de párpado inferior
- Dacrioadenitis

**Gracias**