



MINISTERIO DE SALUD

Esquema de vacunación 2024



| Recién Nacidos/as | 2, 4 y 6 meses | 12 meses | 15 meses | 18 meses | 24 meses | 4 años | Niñas y adolescentes de 9 a 18 años | Adolescentes y Adultos | Mujeres Embarazadas | Adultos Mayores, Grupos de Riesgo y Personas con Enfermedades Crónicas | Otras Vacunas |
|---|---|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|--|--|--|---|
| <p>BCG</p> <p>Previene formas graves de Tuberculosis</p> | <p>Hexavalente</p> <p>Difteria, Tosferina, Tétanos, Poliomielitis, Haemophilus Influenzae tipo b y Hepatitis B</p> | <p>1ª dosis de: Triple viral tipo SPR</p> <p>Sarampión, Paperas y Rubéola</p> | <p>1ª dosis: Hepatitis A</p> | <p>1er. Refuerzo de: Hexavalente</p> <p>Difteria, Tosferina, Tétanos, Poliomielitis, Haemophilus Influenzae tipo b y Hepatitis B</p> | <p>2ª dosis: Hepatitis A</p> | <p>2º refuerzo: DPT</p> <p>Difteria, Tosferina y Tétanos</p> | <p>VPH Cuadrivalente</p> <p>Previene el cáncer de cérvix o cuello de matriz, causado por el virus del papiloma humano</p> | <p>Mujeres de 19 a 21 años</p> <p>VPH</p> <p>Dosis única</p> | <p>Tdpa</p> <p>Tetanos, Difteria, Tosferina acelular. Aplicar 1 dosis en cada embarazo a partir de las 20 semanas de gestación</p> | <p>Td</p> <p>Tétanos y Difteria</p> | <p>Fiebre Amarilla</p> <p>Mayores de 1 año y menores de 60 años. Personas que viajen a países endémicos de Fiebre Amarilla</p> |
| <p>HB</p> <p>Hepatitis B, en las primeras 24 horas de vida</p> | <p>Rotavirus</p> <p>2 dosis (2 y 4 meses)</p> | <p>Refuerzo de: Neumococo 13 Valente</p> <p>Meningitis, Neumonía y Otitis media</p> | <p>1ª dosis: Varicela</p> | <p>2ª dosis: Triple viral tipo SPR</p> <p>Sarampión, Paperas y Rubéola</p> | | <p>Refuerzo OPVb Polio oral</p> <p>Poliomielitis</p> | <p>Niños de 9 a 11 años</p> <p>VPH Cuadrivalente</p> <p>Dosis única</p> | <p>Td</p> <p>Tétanos y Difteria</p> <p>Toda persona debe recibir 1 dosis cada 10 años a partir de los 10 años de edad</p> | <p>Td</p> <p>Tétanos y Difteria a toda mujer embarazada que no cuente con esquema previo, colocar 4 semanas posterior a la Tdpa</p> | <p>Neumococo 23 Valente</p> | <p>Antirrábica Humana</p> <p>-Preexposición (personas de riesgo como veterinarios) -Post exposición (Según Lineamiento Nacional Vigente)</p> |
| | <p>Neumococo 13 Valente</p> <p>2 dosis (2 y 4 meses) Meningitis, Neumonía y Otitis media</p> | | | | | <p>2ª dosis: Varicela</p> | | <p>Td</p> <p>Tétanos y Difteria</p> <p>Toda persona debe recibir 1 dosis cada 10 años a partir de los 10 años de edad</p> | <p>Influenza Tetravalente</p> <p>En su primer control del embarazo no importando la edad gestacional</p> | <p>Influenza Tetravalente</p> <p>Niños de 6 meses a 59 meses, personas adultas mayores de 60 años y personal de salud</p> | <p>SARS Cov-2</p> <p>Población en general a partir de los 5 años de edad. El número de dosis e intervalo varía según la recomendación del tipo de vacuna</p> |