



MINISTERIO DE SALUD

Esquema de vacunación 2025



Recién Nacidos/as	2, 4 y 6 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 años	Niñas y adolescentes de 9 a 18 años	Adolescentes y Adultos	Mujeres Embarazadas	Adultos Mayores, Grupos de Riesgo y Personas con Enfermedades Crónicas	Otras Vacunas
<p>BCG</p> <p>Previene formas graves de Tuberculosis</p> <p>HB</p> <p>Hepatitis B, en las primeras 24 horas de vida</p>	<p>Hexavalente</p> <p>Difteria, Tosferina, Tétanos, Poliomielitis, Haemophilus Influenzae tipo b y Hepatitis B</p> <p>Rotavirus</p> <p>2 dosis (2 y 4 meses)</p> <p>Neumococo 13 Valente</p> <p>2 dosis (2 y 4 meses) Meningitis, Neumonía y Otitis media</p>	<p>1ª dosis de: Triple viral tipo SPR</p> <p>Sarampión, Paperas y Rubéola</p> <p>Refuerzo de: Neumococo 13 Valente</p> <p>Meningitis, Neumonía y Otitis media</p>	<p>1ª dosis: Hepatitis A</p> <p>1ª dosis: Varicela</p>	<p>1er. Refuerzo de: Hexavalente</p> <p>Difteria, Tosferina, Tétanos, Poliomielitis, Haemophilus Influenzae tipo b y Hepatitis B</p> <p>2ª dosis: Triple viral tipo SPR</p> <p>Sarampión, Paperas y Rubéola</p>	<p>2ª dosis: Hepatitis A</p>	<p>Refuerzo: DPaT-IPV</p> <p>Difteria, Tosferina, Tétanos y Poliomielitis</p> <p>2ª dosis: Varicela</p>	<p>VPH Cuadrivalente</p> <p>Previene el cáncer de cérvix o cuello de matriz, causado por el virus del papiloma humano</p> <p>Dosis única</p> <p>Niños de 9 a 11 años</p> <p>VPH Cuadrivalente</p> <p>Dosis única</p>	<p>Mujeres de 19 a 21 años</p> <p>VPH</p> <p>Dosis única</p> <p>Td</p> <p>Tétanos y Difteria Toda persona debe recibir 1 dosis cada 10 años a partir de los 10 años de edad</p>	<p>Virus Sincitial respiratorio</p> <p>Previene la bronquiolitis y la neumonía causadas por el VSR en niños y niñas en los primeros 6 meses de edad mediante la vacunación de las embarazadas. Aplicar 1 dosis entre las 32 a 36 semanas de Gestación</p> <p>Tdpa</p> <p>Tétanos, Difteria, Tosferina acelular. Aplicar 1 dosis en cada embarazo a partir de las 20 semanas de gestación</p> <p>Td</p> <p>Tétanos y Difteria a toda mujer embarazada que no cuente con esquema previo, colocar 4 semanas posterior a la Tdpa</p> <p>Influenza</p> <p>En su primer control del embarazo no importando la edad gestacional</p>	<p>Td</p> <p>Tétanos y Difteria</p> <p>HB</p> <p>Hepatitis B</p> <p>Neumococo 23 Valente</p> <p>Influenza</p> <p>Niños de 6 meses a 59 meses, personas adultas mayores de 60 años y personal de salud</p>	<p>Fiebre Amarilla</p> <p>Mayores de 1 año y menores de 60 años. Personas que viajen a países endémicos de Fiebre Amarilla</p> <p>Antirrábica Humana</p> <p>-Preexposición (personas de riesgo como veterinarios) -Post exposición (Según Lineamiento Nacional Vigente)</p>